

לשימוש וטרינרי בלבד
תרכיב לשימוש בבקר בלבד

BOVILIS™ BVD

בוביליס™ BVD

תרחיף להזרקה לבקר

תכולה : קופסת קרטון המכילה 1 בקבוקון מזכוכית או מפלסטיק של 2, 10, 20, 50, 100, או 250 מ"ל (1, 5, 10, 25, 50, או 125 מנות).

הרכב:

מנה של 2 מ"ל מכילה:

חומרים פעילים:

אנטיגן מומת של BVDV ציטופטוגני (cytopathogenic bovine viral diarrhea), מסוג 1 זן C-86, המכיל 50 יחידות אלייזה (EU=Elisa units) המשרה לפחות $4.6 \log_2$ * יחידות VN. *ממוצע הכייל לנטרול נגיף הושג במבחן potency

אדג'ובנט:

Aluminium 3+ (as Al-phosphate and Al-hydroxide) 6-9 mg

חומר משמר:

Methyl parahydroxybenzoate 3 mg

בנוסף עשויים להמצא עקבות של אנטיביוטיקות וסרום עגל כשאריות מהפקת האנטיגן.

התוויות:

תרכיב מומת להשראת חיסון פעיל של פרות ועגלות החל מגיל 8 חודשים ואילך להגנת העובר מפני זיהום של נגיף Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) העובר דרך השליה.

מין מטרה:

בקר (פרות ועגלות).

מינון ודרך המתן:

מנה אחת של 2 מ"ל להזרקה תוך שרירית. לפני השימוש, יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר ($15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$). יש לנער היטב לפני השימוש. יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים.

ניתן לחסן כל עדר החל מגיל 8 שבועות ואילך. ניתן לצפות להגנת עובר אם חיסון ראשוני יינתן עד 4 שבועות לפני תחילת הריון. חיות שיחוסנו מאוחר יותר מ- 4 שבועות לפני הריון או במהלך תחילת הריון לא תהיינה מוגנות מפני זיהום העובר.

תוכנית חיסונים:

חיסון פרטני:

חיסון ראשוני: שני חיסונים בהפרש של 4 שבועות. מתן חיסון שני לא מאוחר יותר מ- 4 שבועות לפני תחילת הריון.

חיסון חוזר: חיסון אחד 4 שבועות לפני תחילת ההריון הבא.

חיסון עדר:

חיסון ראשוני: שני חיסונים בהפרש של 4 שבועות. לשימוש בבקר החל מגיל 8 חודשים, יש לחסן את כל החיות.

חיסון חוזר: יש לחסן את כל החיות ברפת חיסון אחד 6 חודשים לאחר החיסון הראשוני עם חיסון חוזר במרווחים של לא יותר מ – 12 חודשים.

תופעות לוואי:

במקרים נדירים מאוד תיתכן נפיחות קלה במקום ההזרקה במשך 14 יום, עליה קלה וחולפת בחום הגוף ויכולות להופיע תגובות רגישות יתר כולל שוק מסוג אנאפילקטי. במקרה של תגובות מסוג אנאפילקטי מומלץ לתת טיפול מתאים כגון אנטי-היסטמין, קורטיקוסטרואיד או אדרנלין. תדירות תופעות הלוואי מוגדרת על פי המוסכמות הבאות:
מאוד שכיח (יותר מאחד מתוך עשרה בעלי חיים שחוסנו מפגין תופעות לוואי במהלך טיפול אחד) שכיח (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל 100 בעלי חיים)
לא שכיח (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל 1,000 בעלי חיים)
נדיר (יותר מאחד ופחות מעשרה בעלי חיים שחוסנו בכל 10,000 בעלי חיים)
מאוד נדיר (פחות מבעל חיים אחד מתוך 10,000 בעלי חיים שחוסנו, לרבות דיווחים מבודדים)

אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

זמן המתנה:

0 ימים.

אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

שימוש במהלך הריון והנקה:

ניתן לשימוש במהלך הריון

אזהרות לאדם:

- לשימוש ווטרינרי בלבד.
- לא לשימוש באדם. לשימוש בבע"ח בלבד בהתאם להוראות.
- הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
- במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב או הזרקה עצמית, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תוויית התרכיב.

תגובות בין תרופתיות:

אין מידע זמין על הבטיחות והיעילות של חיסון זה בעת שימוש עם כל מוצר רפואי וטרינרי אחר. ההחלטה להשתמש בחיסון זה לפני או אחרי כל מוצר רפואי וטרינרי אחר צריכה להיעשות בכל מקרה ומקרה לגופו.

מינון יתר:

במתן של מינון כפול לא נצפו תגובות נוספות על אלו המתוארות בסעיף תופעות הלוואי.

חוסר התאמה:

אין לערבב עם מוצר רפואי וטרינרי אחר.

הוראות אחסנה :

יש לאחסן הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש להגן מפני אור.
יש לאחסן בקירור בטמפרטורה של 2°C-8°C.
אין להקפיא.
אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

חיי מדף לאחר הפתיחה:

יש להשתמש בתוך 10 שעות.

אריזה:

קופסת קרטון המכילה 1 בקבוקון מזכוכית או מפלסטיק של 2, 10, 20, 50, 100, או 250 מ"ל (1, 5, 10, 25, 50, או 125 מנות).
לא כל גדלי האריזות משווקים.
בקבוקון עשוי זכוכית הידרוליטית מסוג I (Ph. Eur.) או מפלסטיק (polyethylene-terephthalate) (PET) סגור עם מכסה גומי ניטרילי אטום במכסה אלומיניום.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרי שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

מידע נוסף:

בובילים BVD הוא תרכיב מומת של נגיף BVD ציטופטוגני מסוג 1 זן C-86 המכיל 50 יחידות אלייזה המשרה לפחות $4.6 \log_2$ יחידות VN למנה. הנגיף מגודל בתוך תרביות תאים ומומת עם בטה-פרופילוקטון. לאחר המתה, האנטיגן מעורבב ונספג באדג'ונט מלחי אלומיניום. התרכיב מכיל מתיל פרה-הידרוקסידיבנזואט כחומר משמר ועקבות אנטיביוטיקה וסרום עגל כשאריות מהפקת האנטיגן.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

יבואן ומשווק: וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל,
6085001.
טל': 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך 02.2018
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
היגו: 2-019-07-06