

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד
לשימוש בכלבים בלבד

נוביווק די.איי.פי.פי.איי NOBIVAC® DHPPi

תרכיב חי של נגיפי דיסטמפר (כלבלבת), אדנו-וירוס, פרוו ופרה-אינפלואנזה מיובשים בהקפאה, להמסה ולהזרקה לכלבים

תכולה:

10 או 50 בקבוקונים המכילים מנה אחת.

תיאור

כל בקבוקון מכיל מנה אחת של 1 מ"ל תרכיב בצורת גוש המיובש בהקפאה להמסה ומכיל נגיפים חיים:

Live canine distemper virus (CDV), strain Onderstepoort	$\geq 10^{4.0}$ TCID ₅₀ *
Live canine adenovirus 2 (CAV2), strain Manhattan LPV3	$\geq 10^{4.0}$ TCID ₅₀ *
Live canine parvovirus (CPV), strain 154	$\geq 10^{7.0}$ TCID ₅₀ *
Live canine parainfluenza virus (CPi), strain Cornell	$\geq 10^{5.5}$ TCID ₅₀ *

* TCID₅₀ = median Tissue Culture Infective Dose

התרכיב מכיל מייצב ושאריות אנטיביוטיקה.

התוויות

להשראת הגנה חיסונית פעילה בכלבים נגד כלבלבת (CDV), דלקת כבד זיהומית אשר נגרמת על ידי אדנו-וירוס מסוג 1, מחלת פרוו (CPV) ומחלת נשימה אשר נגרמת על ידי פרה-אינפלואנזה (CPi) ואדנו ווירוס מסוג 2 (CAV2).

תכניות חיסון

מנה אחת של תרכיב Nobivac DHPPi מספיקה להקנות חסינות בכלבים בני 12 שבועות ואילך. כאשר נדרשת הגנה מוקדמת יותר, מנה ראשונה של מרכיבים אלו מומלצת החל מ- 8-10 שבועות אך מכיוון שנוגדנים אימהיים עלולים להפריע לתגובה החיסונית, יש לתת מנה סופית 2-4 שבועות לאחר מכן, למשל בגיל 12 שבועות או יותר.

ההמלצות הבאות נכללות כיוון שסביר שחיסון עם Nobivac DHPPi יהיה חלק מתכנית חיסון רחבה יותר:

א. תכנית לגורים אשר עלולים להיות חשופים לדיסטמפר ו/או פרוו לפני גיל 8-10 שבועות; וסטטוס הנוגדנים האימהיים (MDA) אינו ידוע:

גיל 4-6 שבועות - Nobivac Puppy DP.

גיל 8-10 שבועות - Nobivac DHPPi עם Nobivac Lepto.

גיל 12 שבועות - Nobivac DHPPi עם Nobivac Lepto או Nobivac Rabies.

ב. תכנית לגורים אשר החלו את תכנית החיסון בגיל 8-10 שבועות:

גיל 8-10 שבועות - Nobivac DHPPi עם Nobivac Lepto.

גיל 12 שבועות - Nobivac DHPPi עם Nobivac Lepto או Nobivac Rabies.

ג. תכנית לגורים אשר לא החלו את החיסון לפני גיל 12 שבועות:

גיל 12 שבועות - Nobivac DHPPi עם Nobivac Lepto או Nobivac Rabies.

גיל 14-16 שבועות - Nobivac Lepto.

חיסון דחף

מומלץ לחזור על החיסון לכלבים נגד:

1. כלבלבת, דלקת כבד זיהומית, נגיף פרוו ומחלת נשימה אשר נגרמה על ידי ואדנו וירוס מסוג 2 - כל 3 שנים.
2. מחלת נשימה אשר נגרמת על ידי נגיף פרה אינפלואנזה – כל שנה.

מינון ודרך מתן

יש להזריק באופן תת עורי את התכולה של בקבוקון אחד המכיל תרכיב מומס. יש למהול מייד לפני השימוש על ידי הוספת תכולת בקבוקון אחד (1.0 מ"ל) של Nobivac Lepto (תרכיב נגד לפטוספירוסיס) או בקבוקון אחד (1.0 מ"ל) Nobivac Rabies, או בקבוקון אחד (1.0 מ"ל) של ממס נוביווק. לאחר המיהול, יש להשתמש בתרכיב תוך 30 דקות.

אזהרות לבעלי חיים:

- יש לחסן כלבים בריאים בלבד לאחר ביצוע בדיקה רפואית נאותה.
- יש להימנע ממגע עם מקורות זיהום פוטנציאליים בניגוד דיסטמפר, אדנו- וירוס ו/או נגיף פרוו עד 7 ימים לאחר החיסון.
- יש להשתמש בצידוד סטרילי להזרקה, אך יש להימנע מזיהום התרכיב על ידי שאריות חומרי חיסון או אלכוהול.

אזהרות לאדם:

- **לשימוש וטרינרי בלבד.**
- הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
- במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תופעות לוואי:

מדי פעם עלולה להופיע תגובת רגישות יתר קלה מסוג אנאפילקטי לאחר החיסון, כפי שאפשרי בעקבות חשיפה לחלבונים זרים. ברוב המקרים התופעה חולפת מעצמה.

שימוש במהלך הריון או הנקה:

מותר לשימוש בכלבות הרות.

תגובות בין תרופתיות:

- כאשר החיסון הוא חלק מתוכנית חיסונים רחבה יותר, Nobivac Lepto ו- Nobivac Rabies יכולים לשמש להמסת Nobivac DHPPi המיובש בהקפאה.
- אין מידע זמין לגבי בטיחות ויעילות תרכיב זה כאשר נעשה שימוש במקביל עם תכשירים רפואיים וטרינריים אחרים למעט התכשירים שהוזכרו. ההחלטה האם להשתמש בתרכיב זה לפני או אחרי שימוש בתכשירים רפואיים וטרינריים אחרים צריכה להתקבל לפי כל מקרה לגופו.
- אין לערבב עם כל מוצר תרופתי וטרינרי אחר מלבד ממס נוביווק או תרכיבי נוביווק שהוזכרו לעיל.

מינון יתר:

אין סימנים מיוחדים במנת יתר של פי 10.

הוראות אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בקירור ($2-8^{\circ}\text{C}$).

יש להגן מפני אור.

יש להיזהר ולמנוע חשיפה ממושכת או חוזרת לסביבת טמפרטורות גבוהות, לאחר ההוצאה מהמקרר לפני השימוש.

בזמן חשיפה לתנאי הקיץ החמים, יכולה להיות הפחתה משמעותית ביעילות התרכיב תוך מספר שעות. ניתן לאחסן ממס נוביווק בטמפרטורת החדר. אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על-גבי האריזה.

האריזה

קופסא או מגשית המכילה בקבוקונים של Nobivac DHPPi ובקבוקונים של ממס נוביווק, או קופסא או מגשית המכילה רק בקבוקונים של Nobivac DHPPi. הבקבוקון מזכוכית מסוג I עם פקק גומי מסוג halogenobutyl ואטום במכסה אלומיניום צבעוני.

הכמות באריזה

קופסאות של 5, 10, 25 או 50 בקבוקונים המכילים מנה בודדת.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי: מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות

מידע נוסף

ידוע מניסיון שסטטוס הנוגדנים האימהיים של הגורים בשגר משתנה מאוד, לכן אין להסתמך על בדיקה סרולוגית שנערכה לכלבה בלבד.

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

יבואן ומשווק:

וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם, ישראל 6085001.
טלפון: 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 03.2018

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 6-100-07-12