

נוביוק® רביס

NOBIVAC® RABIES

לשימוש בחיות בלבד

תיאור:

התרכיב מכיל תרבית מומתת של נגיף כלבת, ששובט מתוך זן Pasteur RIV עם פוטנטיות של $\leq 2 \text{ I.U.}$ הנגיף גדל על שבט BHK-21 CT cell line ועובר אינאקטיבציה עם beta-propiolactone. הוא מוצג כ-
aluminium phosphate absorbed vaccine.

הרכב:

חומרים פעילים:

נגיף כלבת מזן Pasteur RIV: לפחות 2 I.U. לכל מנה.

חומר בלתי פעיל:

Thiomersal 0.01%.

תצורה פרמצבטית: תרחיף להזרקה.

מיני מטרה: כלבים, חתולים, בקר, כבשים, עזים, שועלים, חמוסים וסוסים.

התוויות: לחיסון פעיל של כלבים, חתולים, בקר, כבשים, עזים, שועלים, חמוסים וסוסים בריאים, ובעקרון כל יונק בריא כנגד כלבת.

התוויות נגד:

אין.

אזהרות פרמצבטיות:

אפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר ($15-25^{\circ}\text{C}$) לפני שימוש. השתמש בצידוד הזרקה מחוטא. נער לפני ובזמן השימוש.

אזהרות מיוחדות לשימוש בחיות:

חסן חיות בריאות בלבד.

אזהרות מיוחדות לאדם:

אין.

מינון ודרך מתן: 1 מ"ל על ידי הזרקה תת-עורית (S.C.) או תת-שרירית (I.M.).

תכנית חיסון מומלצת:

חמוסים	בקר/סוסים	כלבים/חתולים	
3 חודשים*	6 חודשים*	3 חודשים*	חיסון ראשון מעל גיל:
1 שנים**	2 שנים**	3 שנים**	חיסון חוזר כל:
S.C.	I.M.	I.M. or S.C.	דרך המתן:

*חיסון ראשון יכול להינתן בגיל צעיר יותר, אך חובה לתת זריקה נוספת בגיל 3 או 6 חודשים, תלוי במין החיה.

**המרווח המומלץ בין החיסונים מבוסס על פי תוצאות ניסויי הדבקה בנגיף (challenge experiments). גופי רגולציה מקומיים עשויים לדרוש חיסון חוזר מוקדם יותר.

תוצאות מחקרים סרולוגים מצביעים על כך שחיסון **כבשים, עזים ושועלים** מעניק הגנה של שנה אחת לפחות.

הערות:

- חסן חיות בריאות בלבד.
- לעיתים עלולות להתרחש תופעות מוכללות של רגישות יתר לאחר מתן.
- אפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר (15-25°C) לפני שימוש.
- השתמש בצידוד הזרקה מחוטא.
- נער לפני ובזמן השימוש.
- ניתן להשתמש בנוביוק-רביס להמסת תרכיבים מיובשים בהקפאה לשימוש בכלבים מסדרת נוביווק.
- ניתן לתת בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות את Nobivac Rabies ביחד עם תרכיב Nobivac leptospirosis.
- שמור הרחק מהישג ידם של ילדים.

חסינות:

בכלבים, כיל שיא נוגדנים הופגן 3 שבועות לאחר החיסון.

תופעות לוואי:

לאחר מתן תת עורי, לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.

לעיתים עלולות להתרחש תופעות מוכללות של רגישות יתר לאחר מתן.

שימוש בזמן הריון:

ניתן לשימוש בזמן הריון בכלבים.

תגובות בין-תרופתיות:

ניתן להשתמש בנוביוק-רביס להמסת תרכיבים מיובשים בהקפאה לשימוש בכלבים מסדרת נוביווק.

ניתן לתת בו-זמנית אך בנקודות מתן שונות את Nobivac Rabies ביחד עם תרכיב Nobivac

leptospirosis.

אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של תרכיב זה בשימוש עם מוצר ווטרינרי רפואי אחר למעט המוצרים המצוינים מעל. דיון לגבי שימוש תרכיב זה לפני או אחרי מוצר ווטרינרי רפואי אחר צריך להיקבע על בסיס כל מקרה לגופו.

מינון יתר:

לאחר מתן תת עורי, לעיתים עלול להתפתח גוש בר-מישוש חולף באזור ההזרקה.

זמן המתנה:

לא ישים.

תכונות אימונולוגיות:

תרכיב ויראלי מומת.

ATC vet code for dogs: QI07AA02

התוויה לחיסון פעיל כנגד כלבת

חיי מדף:

לפחות 4 שנים בקירור (2-8°C).

בקבוקון 10 מנות שנוקב – יש להשתמש בו תוך יום עבודה אחד.

הוראות אחסון:

אחסן בטמפרטורה 2-8°C.

אין להקפיא.

הגן מפני אור.

אריזה:

בקבוקוני זכוכית סגורים עם סטופר גומי, אטומים עם מכסה אלומיניום.

הבקבוקונים מכילים 1 או 10 מנות.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או חומרי פסולת**שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי :**

יש להיפטר מחומרי פסולת על ידי הרתחה, שרפה או טבילה בחומר מחטא המאושר על ידי הרשויות המקומיות.

יצרן:

Intervet International B.V, Boxmeer, the Netherlands

יבואן:

וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם 6085001, ישראל.
טלפון: 03-9393000.

