

לשימוש וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

פורסיליס COLICLOS

PORCILIS® COLICLOS

תרחיף להזרקה תוך שרירית לחזירים

תכולה: בקבוק PET או זכוכית המכילים 20, 50, 100 או 250 מ"ל (10, 25, 50 או 125 מנות).

הרכב:

בכל מנה של 2 מ"ל:

חומרים פעילים :

***Escherichia coli* components:**

- F4ab fimbrial adhesin	$\geq 9.3 \log_2 \text{ Ab titre}^1$
- F4ac fimbrial adhesin	$\geq 6.5 \log_2 \text{ Ab titre}^1$
- F5 fimbrial adhesin	$\geq 7.5 \log_2 \text{ Ab titre}^1$
- F6 fimbrial adhesin	$\geq 7.4 \log_2 \text{ Ab titre}^1$
- LT toxoid	$\geq 10.5 \log_2 \text{ Ab titre}^1$

***Clostridium perfringens* component:**

- Type C antigen	$\geq 20 \text{ IU}$
------------------	----------------------

¹ממוצע טיטר נוגדנים אשר נמדד לאחר מתן התרכיב לעכברים.

אג'ובנט: dl- α -tocopheryl acetate - 150mg

התוויות :

השראת הגנה חיסונית פסיבית בחזרזירים על ידי חיסון פעיל של חזירות בוגרות ומבכירות, להפחתת תמותה וסימנים קליניים במהלך הימים הראשונים לחייהם, הנגרמים על ידי זני *E. coli* אשר מבטאים את האדהזינים (adhesins): *F4ab(K88ab)*, *F4ac(K88ac)*, *F5(K99)*, *F6(987P)* ו/או יצור טוקסואיד LT על ידי *Clostridium perfringens Type C*. נצפתה השפעה מועילה נגד זיהום הנגרם על ידי *C. perfringens type A* בתנאי שדה.

מין מטרה:

חזירים (חזירות בוגרות ומבכירות).

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי

לאחר החיסון עלולה להופיע עליה חולפת בחום הגוף ועלולה להופיע נפיחות זמנית באזור ההזרקה.

אם נצפו תופעות לוואי אחרות או חמורות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

מינון ותוכנית מתן חיסונים מומלצת :

הזרקת מנה אחת (2 מ"ל), תוך-שרירית באזור הצוואר, מאחורי האוזן, לחזירות בוגרות ומבכירות (sows and gilts).
חיסון בסיסי: לחזירות בוגרות ומבכירות אשר טרם חוסנו בתרכיב, יש לחסן בחיסון ראשוני 6 עד 8 שבועות לפני זמן ההמלטה המשוער, ולתת מנת דחף (booster) 4 שבועות לאחר מכן.
חיסון דחף: חיסון חוזר יחיד יבוצע 2 עד 4 שבועות לפני תאריך ההמלטה הצפוי.

אופן השימוש:

לפני שימוש יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפרטורת חדר (15-25°C).
נער היטב לפני השימוש ובמרווחים במהלך השימוש.
יש להשתמש בצידוד חיסון נקי וסטריילי.
המנע מהכנסת גורם מזהם לבקבוק התרכיב

זמן המתנה: אפס ימים.

אזהרות לבעלי חיים:
יש לחסן בעלי חיים בריאים בלבד.

שימוש במהלך הריון והנקה:
ניתן לשימוש במהלך הריון.

מנת יתר:
אין תופעות לוואי מיוחדות מלבד אלו שצוינו בסעיף 'תופעות לוואי'.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לרחוץ ידיים היטב לאחר השימוש בתרכיב.
- במקרה של הזרקה עצמית או חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב פנה מיד ליעוץ רפואי והראה לרופא את תווית או עלון התרכיב.
- במידה והתרכיב נשפך על העור, יש לשטוף עם מים וסבון.
- במקרה של בליעה, יש לשתות מים. יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

תגובות בין תרופתיות:

אין מידע לגבי הבטיחות והיעילות של תרכיב זה בשימוש עם תכשירים וטרינריים אחרים. החלטה לגבי השימוש בתרכיב זה לפני או אחרי תכשיר וטרינרי אחר צריכה להיעשות לכל מקרה בנפרד.

חוסר התאמה:

אין לערבב עם מוצר ווטרינרי רפואי אחר.

תנאי אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בטמפ' 2°C-8°C.

אין להקפיא.

יש להגן מפני האור.

יש להשתמש בתרכיב תוך 10 שעות ממועד פתיחת האריזה.

אין להשתמש לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.

אריזה:

אריזת קרטון המכילה בקבוק PET או זכוכית (Type I) בנפח של 20, 50, 100, 250 מ"ל. הבקבוקים סגורים בפקק גומי

וחתומים עם מכסה אלומיניום.

לא כל גדלי האריזות משווקים.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי, או פסולת שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי

וטרינרי: מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומר פסולת שמקורו ממוצר רפואי וטרינרי יש להשליך בהתאם

לדרישות הרגולטוריות.

מידע נוסף:

קבוצת פרמקותרפואטית: תרכיב חיידיקים מומת.

ATC vet code: Q109AB08

יצרן:

אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

יבואן ומשווק:

וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל, 6085001.
טל': 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך : 12.2018

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגה: 4-253-07-15