

לשימוש וטרינרי בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד  
לשימוש בכלבים בלבד

## **נוביווק® לפטו4**

### **NOBIVAC® LEPTO4**

#### **תרכיב חיידקי לפטוספירה**

**תכולה:** בקבוקון אחד המכיל מנה אחת של התרכיב (1 ml).

**הרכב:**

מרכיבים פעילים	כמות למנה
Leptospira Canicola (LC), LC-NY strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira grippotyphosa (LG)	≥80 hamster PD 80
Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain	≥80 hamster PD 80
Leptospira Pomona (LP)	≥80 hamster PD 80

**חומר משמר:** גנטמיצין ואמפותריצין B

#### **התוויות:**

תרכיב נוביווק לפטו4 הוא תרכיב חיידקים מומת המומלץ לחיסונם של כלבים בריאים לסיוע במניעת מחלה ותמותה הנגרמות על ידי נגיפי *L. pomona*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, ו-*L. grippotyphosa*, מניעת הפרשת נגיף *Leptospira* בשתן (leptospiuria) הנגרמת על ידי נגיפי *L. icterohaemorrhagiae canicola*, ו-*L. grippotyphosa* וסיוע במניעת הפרשת נגיף *Leptospira* בשתן הנגרמת על ידי *L. pomona*.

#### **מינון ודרך מתן:**

יש לחסן במנה אחת (1 מ"ל) תת עורית בגיל 8 שבועות ומעלה. 2-4 שבועות לאחר מכן יש לתת מנת דחף. יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריילים, שלא עוקרו בדרך כימית. יש לנער היטב לפני שימוש.

#### **חיסון חוזר:**

מנה אחת מדי שנה.

#### **אזהרות לבעלי חיים:**

יש לחסן כלבים בריאים ונקיים מטפילים בלבד. יש להשתמש במחטים ומזרקים חדשים, לא מעוקרים כימית. ערבב היטב לפני השימוש. יש לסיים את מלוא התרכיב בפתיחה ראשונה. השימוש במוצר ביולוגי עשוי לייצר אנפילקסיס ו/או תגובות דלקתיות אחרות שנובעות מרגישות-יתר. אנטידוט: ניתן לתת אפינפריין, קורטיקוסטרואידים ואנטי-היסטמינים בהתאם לאופי ולחומרת התגובה.

## **אזהרות לאדם:**

### **לשימוש וטרינרי בלבד.**

הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.  
המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.  
אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.  
יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.  
במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

## **תופעות לוואי:**

במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר מידית חריפה (אנפילקסיס), חום, עייפות, בצקת בפנים, הקאות או שלשולים זמן קצר לאחר החיסון.  
אם נצפו תופעות לוואי אחרות מאלו שצוינו על גבי העלון, יש ליידע את הווטרינר המטפל.

## **שימוש במהלך הריון:**

אסור לשימוש בכלבות הרות.

## **תגובות בין תרופתיות:**

אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים.

## **הוראות אחסון:**

יש להרחיק מהישג ידם וראייתם של ילדים.  
יש לאחסן את התרכיב בקירור ( $2-7^{\circ}\text{C}$ ).  
אין להקפיא.

**צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרים שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**  
יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות במדינה.

**אריזה:** קופסה עם 25 בקבוקונים. בקבוקון אחד המכיל מנה אחת של התרכיב (1 ml), סגור עם פקק גומי, וחתום במכסה אלומיניום.

**יצרן:** אינטרווט בע"מ, אומהה, אג. אי 68103 ארה"ב

**בעל הרישום:** אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

*עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים*

*בתאריך: 01.2020*

*מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים*

*היגו: 6-288-07-15*